Descriptions of some new Pericopides *in the Collection of* Mr. W. Wilson Saunders: by A. G. Butler, F.L.S., F.Z.S., &c.

Pericopis Fantasma, sp. nov.

Alæ anticæ supra area apicali-externa et area interna late nigro-fuscis, costa, plaga disco-cellulari et area disco-discoidea pallide-fuscis, fascia lata subcuneiformi maculam disco-cellularum includente, sordide et pallide ochracea, puncto basali rosacea, venis nigro-fuscis: posticæ flavissimæ, marginibus late nigris, sed costa apud basin fuscescente, litura disco-cellulari venisque nigris; corpus thorace nigro-fusco, collo flavo, tegillis roseo notatis: abdomine flavo, fascia dorsali nigro, ano coccineo.

Alæ subtus fuscæ, anticæ area basali et macula disco-cellulari nigrescentibus, fascia subcuneiformi flavissima maculam disco-cellularem includente, puncto basali coccineo; posticæ fuscæ, plaga media pyriformi flavissima, venis nigris, area interna flavo strigosa, puncto basali coccineo: corpus fuscum; abdomine lateraliter flavo maculato, ano coccineo: exp. alar. unc. 2, lin. 6.

Bogota.

One of the most beautiful of the *Pericopides*, it is nearly allied to *P. Parnassiodes*.

Pericopis Lucifer, sp. nov.

Alæ anticæ rufo-fuscæ, plaga cuneiformi basali disco-discoidea, fascia obliqua postmedia, et fasciola pone cellam, hyalino-albidis, a venis interruptis; posticæ niveæ, area interna grisea, marginibus costali et externa, litura disco-cellulari venisque nigris: corpus thorace fusco, collo albo, tegillis luteis; abdomine pallide cæruleo, fascia dorsali fusco, ano aurantiaco; alæ subtus fere velut supra; anticæ fasciis hyalino-albis, macula basali aurantiaca; posticæ macula basali aurantiaca: corpus album, thorace fuscescente, ano aurantiaco: exp. alar. unc. 2, lin. 3.

Espirito Santo.

Allied to the preceding species: the *Addua Inclusa* of

Walker also belongs to the same group, but is more nearly allied to *P. Parnassiodes.*

Pericopis Sibylla, sp. nov.

Alæ anticæ supra fuscæ, area basali, fascia lata postmedia et altera subapicali hanc infra cellam conjungente hyalino testaceis, in costam flavis, a venis nigris interruptis, puncto basali fulvo; posticæ ochraceæ, margine costali late fusca, margine externo et litura disco-cellulari nigro-fuscis, costa et punctis tribus apicalibus in serie submarginali, fulvis, punctis quatuor anali-submarginalibus albis: corpus prothorace nigro flavo alboque punctato: meso- et metathorace fusco, abdomine luteo, fascia dorsali cinereo-fusco.

Alæ anticæ subtus fuscæ flavo-hyalino trifasciatæ, punctis submarginalibus albis, macula basali fulva; striga interna ochracea; posticæ pallide ochraceæ marginibus costali et externo late nigris, costa, maculis subapicalibus et lunulis subanalibus submarginalibus, fulvis, punctis antemarginalibus albis: corpus thorace fusco; abdomine flavo, lateraliter cinereo: exp. alar. unc. 2, lin. 1.

Espirito Santo.

Allied to *P. Nubila.*

Pericopis Flora, sp. nov.

♂. Alæ anticæ supra velut in *P. Leucophæa;* posticæ fere velut in *P. Leucophæa* fascia autem coccinea duplo latiore; alæ subtus fere velut in *P. Leucophæa,* fascia autem posticarum multo latiore, ad apicem continuata: exp. alar. unc. 1, lin. 11.

♀. Alæ supra fuscæ area apicali et fascia cellam transerrante nigro-fuscis, striga subcostali discoidea, a fascia nigro-fusca interrupta flava, puncto basali coccineo, fasciola subapicali lutea a venis nigris interrupta, punctis indistinctis submarginalibus albidis: posticæ nigro-fuscæ fascia lata submarginali maculari coccinea, punctis sex antemarginalibus albis: corpus fuscum, prothorace flavo punctato; abdomine fulvo maculato, ano aurantiaco: alæ subtus fuscæ; anticæ area basali fulvo irrorato, macula

basali coccinea, fascia postmedia luteo irrorato, et fascia subapicali lutea, punctis submarginalibus indistinctis albidis; posticæ cellula discoidali fulvo irrorata, fascia macularum coccinearum pallidiore, aliter velut supra; corpus cinerescens: exp. alar. unc. 2, lin. 10.

Guatemala. ♂, Coll. B.M.; ♀, Coll. Saunders.

Nearly allied to *P. Leucophæa*, but quite distinct.

Gyara Clara, sp. nov.

Alæ supra hyalino-niveæ velut in *G. Fenestrata*, costa autem cinerea, macula basali alba ochraceo cincta, venis nigris: corpus thorace albo, ochraceo maculato, linea dorsali nigra; capite nigro, albo quadrimaculato, antennis albidis fusco-pectinatis; abdomine albo nigro trilineato; alæ subtus fere velut supra sed marginibus fusco irroratis et venis areæ basali albis, macula basali ochracea; corpus thorace albo; capite palpis albis nigro annulatis; abdomine albo: exp. alar. unc. 2, lin. 2.

Espirito Santo.

Allied to *G. Fenestrata*, but very distinct.